

## ZALECENIA PIELĘGNACYJNE:

Zalecenia dotyczą dwóch pierwszych sezonów wegetacyjnych po posadzeniu roślin.

1. Podlewanie.  
Bezpośrednio po posadzeniu należy rośliny obficie podlać i utrzymać podłoże lekko wilgotne przez około miesiąc. Należy zwrócić szczególną uwagę by było ono wilgotne a nie mokre. Woda nie powinna się utrzymywać na powierzchni terenu dłużej niż kilkadziesiąt minut po podlaniu lub deszczu.  
W kolejnych miesiącach podlewanie uzależnione powinno być od przebiegu temperatur i opadów atmosferycznych i przeprowadzane każdorazowo w razie wystąpienia okresów suszy, ze szczególnym uwzględnieniem okresu wiosny i lata.
2. Nawożenie.  
Pierwsze nawożenie powinno być wykonane po ukorzenieniu się nowo posadzonych roślin czyli około 1 miesiąca od posadzenia i być wykonane nawozem wieloskładnikowym. Jeśli sadzenie miało miejsce wiosną lub latem do nawożenia zaleca się użycie nawozów azotowych, jeśli jesienią - nawozów o zmniejszonej zawartości azotu tzw. nawozów jesiennych.  
Zabieg powinien być przeprowadzany minimum 2 razy w roku, na początku i w pełni sezonu wegetacyjnego.
3. Pielenie/koszenie.  
Zabieg wykonuje się według potrzeb w zależności od szybkości wzrostu i natężenia występowania chwastów, minimum 4 razy w sezonie wegetacyjnym. Zaleca się by pierwsze pielenie nastąpiło dopiero po ukorzenieniu się posadzonych roślin czyli około 1 miesiąc od posadzenia.
4. Cięcie.  
Zabieg jest zależny od gatunku roślin.
  - czosnek – usuwanie przekwitłych kwiatostanów,
  - kocimiętka – usuwanie przekwitłych kwiatostanów po wiosennym kwitnieniu i wczesną wiosną oraz podczas wiosennej pielęgnacji przed wznowieniem wzrostu po zimie,
  - macierzanka – nie wykonuje się cięcia,
  - róża okrywowa – usuwanie chorych i martwych pędów podczas wiosennej pielęgnacji, usuwanie przekwitłych kwiatów – według potrzeb,
  - sesleria – wycinanie martwych liści podczas wiosennej pielęgnacji,
  - sosna (kosodrzewina) – usuwanie ewentualnych martwych gałęzi w czasie prac pielęgnacyjnych,
  - szalwia - usuwanie przekwitłych kwiatostanów po kwitnieniu i wczesną wiosną oraz podczas wiosennej pielęgnacji przed wznowieniem wzrostu po zimie.
5. Wymiana obumarłych roślin.  
W razie obumarcia roślin zaleca się ich natychmiastową wymianę na zdrowe, by zapobiec roznoszeniu się chorób i szkodników.